

ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

VANGUARD-7

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ (Α)

Κάθε μία δόση 1 ml περιέχει:

Λυοφιλοποιημένο τμήμα

Ζωντανός εξασθενημένος ιός της νόσου του Carre στέλεχος (SNYDER HILL)
το ελάχιστο 10^3 CCID₅₀

Ζωντανό εξασθενημένο αδενιοί τύπος 2, στέλεχος Manhattan,
το ελάχιστο $10^{3.2}$ CCID₅₀

Ζωντανό εξασθενημένο ιό παραινφλουένζας, στέλεχος NL-CPI-5,
το ελάχιστο $10^{6.0}$ CCID₅₀

Υγρό τμήμα

Ζωντανό εξασθενημένο παρβοϊό σκύλου, στέλεχος NL-35-D,
το ελάχιστο 10^7 CCID₅₀

Αδρανοποιημένη *Leptospira canicola*, το ελάχιστο 60 NU

Αδρανοποιημένη *Leptospira icterohaemorrhagiae*, το ελάχιστο 60NU

Έκδοχα

Albumine max 1.5MG

Water for injection q.s 1 ml

3. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

Zoetis Hellas SA, Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι 15125, Αττική, Ελλάδα,
Τηλ: +302106791900, Fax: +30 210 6748010, ΑΑΚ: 32423/03.10.2000

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

ZOETIS BELGIUM S.A., LOUVAIN-LA NEUVE, ΒΕΛΓΙΟ

Τοπικός διανομέας στην Κύπρο:

VitaTrace Nutrition Ltd, 2033, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλ: +35722426527, Fax: +35722498325, ΑΑΚ: 16340

4. ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ (ΩΝ)

Σκύλοι από την ηλικία των 6 εβδομάδων



5.ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για την ενεργητική ανοσοποίηση των σκύλων και την πρόληψη της θνησιμότητας και των κλινικών συμπτωμάτων της μόρβας, την πρόληψη της θνησιμότητας και των κλινικών συμπτωμάτων που περιλαμβάνουν λευκοπενία και την μείωση της διασποράς του ιού, που προκαλείται από τον παρβοϊό του σκύλου (τύποι 2a, 2b και 2c), για την μείωση της θνησιμότητας και των κλινικών συμπτωμάτων από την λοίμωξη από τον αδενοϊό τύπο 1 του σκύλου, την μείωση των κλινικών συμπτωμάτων και τη λοίμωξης ή την απέκκριση από τον τύπο 2 αδενοϊό του σκύλου.

Αναμνηστικός εμβολιασμός:

Για τα συστατικά στοιχεία της Leptospira- συνίσταται ετήσιος αναμνηστικός εμβολιασμός .

6.ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ

Προσθέσατε το υγρό τμήμα του εμβολίου στο λυοφιλοποιημένο τμήμα, ανακινείστε καλά και χορηγείστε όλο το περιεχόμενο αμέσως υποδόρια.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σκύλοι από την ηλικία των 6 εβδομάδων.

Προσθέσατε το υγρό τμήμα του εμβολίου στο λυοφιλοποιημένο τμήμα, ανακινείστε καλά και χορηγείστε όλο το περιεχόμενο αμέσως υποδόρια.

Έχει αποδειχθεί ότι το Vanguard-7 είναι ασφαλές για τον εμβολιασμό νεαρών σκύλων από την ηλικία των 6 εβδομάδων.

Όταν οι σκύλοι που εμβολιάζονται έχουν ηλικία μικρότερη των 12 εβδομάδων, πρέπει να επανεμβολιάζονται κάθε 3-4 εβδομάδες έως την ηλικία των 16-18 εβδομάδων. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η πιθανότητα εξουδετέρωσης των εμβολιακών ιών από υπάρχοντα μητρικά αντισώματα.

Μια μόνο δόση του ανασυσταθέντος προϊόντος είναι αρκετή για την πλήρη ανοσοποίηση των ενήλικων σκύλων. Όταν όμως εμβολιάζονται ζώα για πρώτη φορά κατά της λεπτοσπείρωσης, απαιτείται και μία δεύτερη δόση εμβολίου κατά της λεπτοσπείρωσης μετά από 14 ημέρες

8.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Συνίσταται ο επαναληπτικός εμβολιασμός κάθε χρόνο.

9. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην εμβολιάζονται ασθενή ή έγκυα ζώα.

Να μην χορηγείται υπεράνοσος ορός ή ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, έως και ένα μήνα από την ημέρα του εμβολιασμού.

10.ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

Υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης παροδικού οιδήματος στο σημείο της ένεσης.

11.ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται.



12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία +2 °C - +8 °C προστατευμένο από το φως. Να μη καταψύχεται. Υπό αυτές τις συνθήκες ο χρόνος ζωής είναι 24 μήνες.

13. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Καμία

14. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Κενά ή μερικά χρησιμοποιημένα φιαλίδια να καίονται ή να απολυμαίνονται με κατάλληλο απολυμαντικό πριν την απόρριψή τους.

15 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.